

В. В. Печковский, Л. С. Ещенко, Л. Н. Щегров, Ю. П. Ключев,
И. В. Петрашень

О ПРИМЕНЕНИИ ФОСФАТОВ В КАЧЕСТВЕ КАТАЛИЗАТОРОВ В ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Фосфаты ряда металлов проявляют высокую каталитическую активность в процессах кислотного катализа, например, дегидратации и этирификации спиртов, изомеризации циклогексана, дегидратации этилбензола и др. Представило определенный интерес исследовать каталитические превращения терпеновых углеводов в присутствии продуктов дегидратации аморфного и кристаллического гидратов трехзамещенного ортофосфата железа.

На примере α -пинена отмечено, что при катализе в жидкой и паровой фазах наблюдается, наряду с изомеризацией, и процесс полимеризации, который в жидкой фазе преобладает. Показано, что активность катализаторов, приготовленных на основе трехзамещенных фосфатов железа, зависит, в частности, от количества гидратной воды в них, температуры и продолжительности процесса, вида исходных гидратов фосфатов железа.

В. В. Печковский, М. И. Кузьменков, Г. Х. Черчес,
Т. И. Баранникова

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ПРОМЫШЛЕННОГО ГЕКСАМЕТАФОСФАТА НАТРИЯ

Состав стекловидных полифосфатов натрия, выпускаемых в настоящее время промышленностью под названием «гексаметафосфат натрия», не изучен в достаточной мере. В данной работе образцы пяти различных партий гексаметафосфата натрия, выпускаемого Ивановским химзаводом, были исследованы методами хроматографии на бумаге, потенциометрического титрования концевых групп и ИК — спектроскопии.

Установлено, что в состав исследуемого продукта входят линейные и в небольшом количестве кольцевые фосфаты. Значения среднечислового молекулярного веса полифосфатов оказались равными 800, 900, 1300, 2200 и 5700 для образцов пяти партий. Общее содержание P_2O_5 в образцах различно и находится в пределах 60—70 вес. %, а значения

$R = \frac{Na_2O + H_2O}{P_2O_5}$ (мол.) равны 1,04—1,30. По данным потенциометрического титрования исследуемых образцов найдено,