М. В. Рымовская, канд. техн. наук, доц.,
Р. М. Маркевич, доц., канд. техн. наук, доц.,
А. А. Масехнович, ассист., О. В. Нестер, ассист.
(БГТУ, г. Минск)

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ АЭРАЦИИ И НАГРУЗКИ ПО ОРГАНИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАНУЛ АЭРОБНОГО АКТИВНОГО ИЛА

Аэробная биологическая очистка в системах с флокулированным илом используется практически повсеместно. При воздействии ряда факторов одновременно с рыхлыми хлопками ила формируются гранулы, представляющие собой компактные стабильные округлые структуры, в которых клетки микроорганизмов плотно упакованы в матрикс экзополимеров, поэтому скорость деструкции органических веществ и эффективность отделения от биологически очищенной воды в системах с гранулированным илом больше, чем в системах с флокулированным илом. Несмотря на то, что биологические аспекты различаются, влияние физико-химических факторов на образование гранул аэробного, анаэробного и аннамокс-ила являются общими для всех видов илов. Наиболее значимыми условиями формирования таких гранул на настоящем этапе считают чередование периодов голодания и избытка питания, гидродинамические условия, присутствие в среде двухвалентных катионов, образование клетками микроорганизмов экзополисахаридов и экзопротеинов, межвидовые взаимодействия микроорганизмов [1]. Для аэробного активного ила среди важных факторов отмечают использование продленной аэрации и потому – наличие периодов эндогенного дыхания [2]. Интересным подходом является использование гидроциклонов для отбора «тяжелой» (более плотной и компактной) фракции флокулированного ила [3].

Объектом исследования являлся процесс аэробной очистки городских сточных вод в лабораторных биореакторах с флокулированным активным илом.

Предмет исследования – эффективность образования и морфология скоплений микроорганизмов активного ила (хлопков и гранул). В ходе эксперимента варьировались два основных условия функционирования ила: нагрузка по органическим веществам (загрязнителям) в составе сточной воды и уровень аэрации.

Цель работы – оценить влияние уровня аэрации и нагрузки по органическим веществам на образование гранул аэробного активного ила.

При оценке качества ила учитывали развитие нитчатых форм бактерий в хлопке активного ила, определяли размер хлопков и гранул ила с использованием объект-микрометра. При микроскопировании оценивали плотность хлопков ила с делением их на «легкую» и «тяжелую» фракции, опираясь на сравнительный анализ интенсивности луча света, проходящего через микроскопируемый препарат, и на характер поверхности (края) хлопков.

Для моделирования биотехнологических систем использовали уплотненный активный ил из аэротенка Минской очистной станции и модельную сточную воду. В качестве рабочих нами были выбраны режимы подпитки, обеспечивающие нагрузку по органическим веществам по ХПК 530 и 1060 мгО/(дм³·сут), что интерпретировали как условия моделирования двух вариантов средненагружаемых систем по нижней и близкой к верхней границам. В период пуска системы выдерживали при нагрузке 210 мгО/(дм³·сут). Подпитку проводили 1 раз в сут, режим эксплуатации – полунепрерывный.

Для моделирования различающихся условий аэрации биореакторы помещали в шейкеры-инкубаторы с круговым движением платформ и различающейся интенсивностью встряхивания. Концентрации растворенного кислорода для аноксидных условий, умеренной и средней аэрации в условиях эксплуатации составили соответственно 0,8±0,4, 1,5±0,3, 2,6±0,3 мгО₂/дм³. Особенностью этой работы стало накопление исходного инокулята для моделирования каждой из систем в двух вариантах условий: аноксидных и при средней аэрации.

Уровень аэрации и нагрузка по органическим веществам в условиях эксперимента не оказывали существенного влияния на развитие нитчатых форм бактерий в хлопке активного ила (рис. 1), они встречались в небольшом количестве и не оказывали влияния на структуру хлопка.

Рисунок 1 – Микрофотографии аэробного активного ила из модельных систем 100×, полученные в аноксидных (а, б) и аэробных (в, з) условиях

В табл. 1 приведены результаты оценки влияния уровня аэрации и низкой нагрузки по органическим веществам на этапе накопления инокулятов на размер хлопков и гранул активного ила.

Таблица 1 – Размер хлопков и гранул при выдерживании модельных биореакторов в режиме подпитки 1 раз в 5 сут

Длительность выдерживания в режиме подпитки 210 мгО ₂ /(дм ³ ·сут) в период пуска, сут	Концентрация растворенного кислорода мг О ₂ /дм ³			
	0,8±0,4	2,6±0,3	0,8±0,4	2,6±0,3
	Средний размер, мкм:			
	хлопков ила		гранул ила	
3	1. 10-40	2. 10-40	3. нет	4. нет
7	5. 50-150	6. 50-100	7. нет	8. нет
14	9. 100-300	10. 200-600	11. 500-1000	12. 900-14000
28	13. 400-700	14. 100-400	15. 400-700	16. 500-800

Хлопки ила в выбранном режиме культивирования в течение первых двух недель увеличились в размерах, в течение следующих двух недель уплотнились в 1,5-2 раза. К концу второй недели эксперимента сформировались крупные гранулы до 1,4 мм, по прошествии еще двух недель они уплотнились и уменьшились в размерах в 1,2-1,8 раза. При уровне аэрации 0,8±0,4 мгО₂/дм³ сформировались хлопки ила, по плотности и размеру сравнимые с гранулами, однако с неровным краем (рис. 2, а в сопоставлении с рис. 2, б).

а

б

Рисунок 2 – Микрофотографии аэробного активного ила из модельных систем 100×, полученные в аноксидных (а) и аэробных (б) условиях

В табл. 2 приведены результаты оценки влияния уровня аэрации и нагрузки по органическим веществам на размер хлопков и гранул активного ила. Размер хлопков ила «легкой» фракции для всех вариантов эксперимента составил в среднем 100-300 мкм. Использование инокулята, накопленного в аноксидных условиях, при условиях средней аэрации привело к формированию относительно мелких хлопков (менее 100 мкм). Плотные хлопки ила («тяжелая» фракция) при средних нагрузках по органическим веществам

формировались преимущественно в условиях умеренной и средней аэрации при накоплении инокулята активного ила в условиях средней аэрации, размер хлопков 100-300 мкм.

Для формирования гранул важным фактором являлась повышенная нагрузка на ил, при этом размер гранул составил от 0,4 до 1,8 мм. В аноксидных условиях при нагрузке по нижней границе средненагружаемых систем на размер гранул повлияли условия накопления инокулята: 0,2-0,6 мм при аноксидных условиях и 0,9- 2,0 мм при средней аэрации.

Таблица 2 – Размер хлопков и гранул при выдерживании модельных биореакторов в режиме подпитки 1 раз в 1 сут при средних нагрузках

Концентрация растворенного кислорода, мгО ₂ /дм ³	Условия накопления инокулята			
	аноксидные		средняя аэрация	
	Нагрузка по органическим веществам на единицу объема, мг О/дм ³			
	530	1060	530	1060
	Размер «легкой» фракции хлопков, мкм			
0,8±0,4	100–300	80–450	150–300	100–300
1,5±0,3	100–200	100–400	50–250	100–300
2,6±0,3	60–250	50–400	100–300	120–300
	Размер «тяжелой» фракции хлопков, мкм			
0,8±0,4	отс.	отс.	отс.	отс.
1,5±0,3	200–350	отс.	100–200	100–300
2,6±0,3	отс.	отс.	200–300	100–300
	Размер гранул, мкм			
0,8±0,4	150–500	400–1600	900-2000	450–1800
1,5±0,3	отс.	400–1200	отс.	400–700
2,6±0,3	200–600	200–2000	отс.	300–1800

Таким образом, при эксплуатации систем аэробной биологической очистки в полунепрерывном режиме подпитки с соблюдением кругового движения жидкости гранулы аэробного активного ила формировались к 14 сут эксперимента и затем уплотнялись. Формированию гранул способствовали эксплуатация модельных систем при повышенных нагрузках по органическим веществам независимо от уровня аэрации, а также поддержание аноксидных условий либо условий средней аэрации при любом варианте нагрузок на ил.

ЛИТЕРАТУРА

1 Mills, S. Unifying concepts in methanogenic, aerobic, and anam-
mox sludge granulation / S. Mills [et al.]. – Environmental Science and

Ecotechnology. – 2024. – Vol. 17. – 2024.
<https://doi.org/10.1016/j.ese.2023.100310>.

2 Wilén, B.-M. The mechanisms of granulation of activated sludge in wastewater treatment, its optimization, and impact on effluent quality / B.-M. Wilén [et al.]. – Applied Microbiology and Biotechnology. – 2018. – Vol. 102. – P. 5005–5020. <https://doi.org/10.1007/s00253-018-8990-9>.

3 Fumasoli, A. Indense - Verfahren für Granulierten Schlamm. Erfahrungen und Erkenntnisse aus einem ein jährigen Pilotenversuch auf der ARA Gossau-Grünigen / A. Fumasoli [et al.] // Aqua & Gas. – 2024. – Vol. 104, No. 1. – P. 32–39.

УДК 665.333.4:665.328

А. Н. Никитенко, канд. техн. наук, доц.,
С. А. Ламоткин, канд. хим. наук, зав. кафедрой
(БГТУ, г. Минск);

А. Е. Отуншиева, магистрант, ст. препод.
(ЮКУ имени М. Ауэзова, г. Шымкент)

ИННОВАЦИОННЫЕ КУПАЖИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ НА ОСНОВЕ СЫРЬЯ, ВЫРАБАТЫВАЕМОГО НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН ЕАЭС

Анализ международных тенденций в области создания инновационных масел показал перспективу разработки купажей, объединяющих в себе множество полезных органических масел из различных видов растительного сырья. В Республике Беларусь, Казахстане и Российской Федерации широко возделываются следующие виды масел: льняное, хлопковое, подсолнечное, рыжиковое, обладающие богатым составом полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) омега-3, омега-6 и омега-9. Данные кислоты необходимы для здоровья человека и, известно, отдельные из них оказывают полезное влияние для предупреждения и лечения сердечно-сосудистых, воспалительных и ряда других заболеваний.

Ожидается, что спрос на натуральные и органические продукты продолжит расти, что приведет к дальнейшему росту спроса на льняное, хлопковое масло как на другие виды ценных масел. Растущее предпочтение потребителями натуральных и органических продуктов является существенным фактором роста спроса на масло.

Льняное масло богато жирными кислотами омега-3, которые известны своими многочисленными преимуществами для здоровья, включая уменьшение воспаления и улучшение здоровья сердца. По-